

Paracetamol 650 mg
Fenilefrina Clorhidrato 10 mg
Vitamina C 50 mg

Bio-Grip[®]

DESCONGESTIVO

Granulado
Vía oral

ANTE CUALQUIER DUDA CONSULTE CON SU MÉDICO Y/O FARMACÉUTICO.

COMPOSICIÓN: cada sobre de 5 gramos contiene: Paracetamol 650 mg, Ácido Ascórbico 50 mg, Fenilefrina Clorhidrato 10 mg. Excipientes: ácido cítrico anhidro, sacarosa, azúcar, amarillo de quinoleína, esencia lima-limón, esencia de miel.

ESTE MEDICAMENTO CONTIENE AZÚCAR.

ACCIÓN TERAPÉUTICA: antipirético, analgésico, descongestivo y aporte de Vitamina C.

USO DEL MEDICAMENTO: LEA DETENIDAMENTE ESTA INFORMACIÓN. BIO-GRIP[®] T DESCONGESTIVO se encuentra indicado para el alivio temporario de la congestión nasal asociada al cuadro gripal acompañado de mal estado general y/o fiebre.

CÓMO USAR ESTE MEDICAMENTO: disolver el contenido de un sobre en una taza de té con agua caliente (equivalente a 130 ml) y tomarlo antes o después de las comidas. No utilizar agua hirviendo. Adultos y niños mayores de 12 años: 1 sobre cada 6 u 8 horas. Dosis máxima: 5 sobres por día.

"SI LOS SÍNTOMAS DE DOLOR PERSISTEN POR MÁS DE 5 DÍAS Y LA FIEBRE POR MÁS DE 3 DÍAS O EMPEORAN CONSULTE A SU MÉDICO."

¿DUDAS? ¿CONSULTAS? 0800-333-3532 (ELEA) | elea.com

ANMAT responde: 0800-333-1234

PRESENTACIÓN: envases con 5 sobres con 5 g cada uno.

MODO DE CONSERVACIÓN Y ALMACENAMIENTO: conservar al abrigo de la luz y a temperatura ambiente, entre 15°C y 30°C. Mantener en su envase original, no debe utilizarse después de la fecha de vencimiento indicada en el envase.

NO USAR SI EL SOBRE NO ESTÁ INTACTO.

MANTENER TODOS LOS MEDICAMENTOS FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

Para mas información ver prospecto interno.

CONTRAINDICACIONES: hipersensibilidad al paracetamol o a alguno de los componentes de la fórmula. Menores de 12 años. No debe iniciarse el tratamiento en pacientes a quienes la aspirina u otros analgésicos antiinflamatorios les producen asma, rinitis, urticaria o reacciones alérgicas severas. Úlcera péptica activa. Antecedentes de úlcera recurrente. El producto no puede ser administrado en caso de enfermedad hepática, hepatitis virales, afecciones renales o alcoholismo. Este medicamento no debe ser ingerido si usted padece glaucoma de ángulo-estrecho, hipertiroidismo severo, taquicardia.

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES: no exceder la dosis recomendada ya que podrían observarse síntomas de nerviosismo, insomnio, mareos, malestar gastrointestinal, aumento de la sudoración, reacciones alérgicas. No tomar más de 5 sobres por día. No está indicado en niños menores de 12 años. Este producto debe ser administrado con precaución a los pacientes con antecedentes de enfermedades del tracto digestivo superior, por la posibilidad de gastritis, úlcera péptica o sangrado gastrointestinal. El paracetamol puede producir daño hepático cuando se ingiere en sobredosis. La ingesta de paracetamol puede alterar ciertas

pruebas de laboratorio, análisis de sangre fundamentalmente.

Si usted consume 3 (tres) o más vasos diarios de bebida alcohólica, consulte a su médico antes de tomar este medicamento. No ingiera otra especialidad medicinal que contenga paracetamol conjuntamente con este producto. Si usted está tomando algún medicamento por alguna enfermedad crónica consulte a su médico antes de ingerir este medicamento. Si usted está tomando algún medicamento, o está embarazada o dando de amamantar consulte a su médico antes de ingerir este medicamento. Si usted padece alguna enfermedad crónica consulte a su médico antes de ingerir este producto.

INTERACCIONES CON OTROS MEDICAMENTOS: si usted toma anticoagulantes, anticonvulsivantes, antibióticos como la rifampicina o el cloranfenicol u otro antiinflamatorio, consulte a su médico antes de ingerir este producto.

REACCIONES ADVERSAS: puede presentarse broncoespasmo en pacientes con predisposiciones por analgésicos. Puede presentarse erupciones cutáneas, alteraciones en la sangre (disminución de plaquetas), insomnio, taquicardia, nerviosismo, sedación, sequedad de mucosas, vómitos y malestar gástrico.

SOBREDOSIS: ante la eventualidad de una sobredosificación concurrir al hospital mas cercano o comunicarse con los centros de toxicología. - Hospital de Pediatría Dr. Ricardo Gutiérrez: (011) 4962-6666/2247. - Hospital Dr. A. Posadas: (011) 4654-6648/4658-7777. - Hospital Fernández: (011) 4808-2655/4801-7767. - Centro de Asistencia Toxicología La Plata: (0221) 451-5555. Optativamente otros centros de intoxicaciones.

Especialidad Medicinal Autorizada por el Ministerio de Salud. Certificado N°: 52.106. Directora Técnica: Laura A. B. Hernández - Farmacéutica. Laboratorio Elea Phoenix S.A., Av. Gral. Lemos N° 2809, Los Polvorines, Pcia. de Buenos Aires, Argentina.

ANTE CUALQUIER DUDA CONSULTE CON SU MÉDICO Y/O FARMACÉUTICO.

Para mayor información comunicarse con el Centro de Atención telefónica 0800-333-3532 | elea.com

Fecha de última revisión: Julio/2011